

<b>Minirin Tablet 0.2mg / 미니린 정 0.2밀리그램</b>	
	<b>▶ 제품명</b>
	미니린정0.2밀리그램 (데스모프레신아세트산 염)
	<b>▶ 원료약품 및 그 분량</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1정(199.71밀리그램) 중</li> <li>- 유효성분: 데스모프레신아세트산염(EP) 0.2 밀리그램 (데스모프레신으로서 0.178밀리그램)</li> <li>- 첨가제: 감자전분, 스테아르산마그네슘, 유 당수화물, 포비돈</li> </ul>
	<b>▶ 의약품통합정보시스템</b>
	<a href="#">의약품통합정보시스템 바로가기 &gt;</a>

<b>▶ 효능 및 효과</b>
일차성 야뇨증 (5세이상), 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨 증상의 치료 (성인에 한함)

<b>▶ 용법 및 용량</b>
<p>1) 일차성 야뇨증(5세 이상) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취침시 데스모프레신아세트산염으로서 0.2mg을 경구 투여한다.</li> <li>- 효과가 충분하지 않을 경우 0.4mg까지 증량할 수 있다.</li> <li>- 치료의 지속여부는 투여 3개월 후 적어도 1주일간 투여를 중지한 상태에서 결정한다.</li> </ul> <p>2) 야간다뇨와 관련이 있는 야간뇨 증상의 치료(성인에 한함) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취침시 데스모프레신아세트산염 0.1mg을 경구 투여한다.</li> <li>- 일주일 후에도 효과가 충분하지 않을 경우 0.2mg으로 증량하고 계속하여 효과가 충분하지 않으면, 일주일 간격으로 증량하여 0.4mg까지 사용할 수 있다.</li> <li>- 용량결정 후 4주 이내에도 임상적인 효과가 없을 경우 투여를 중지한다.</li> </ul> <p>65세 이상 환자의 경우, 이 약으로 치료를 시작하는 것은 권장되지 않으며, 치료가 필요한 고령 환자의 경우, 혈청 나트륨 수치 등을 면밀히 모니터링한다. (사용상주의사항 중 5. 일반적주의 참고)</p>